ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 48 33
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Средство дезинфицирующее ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-ЭКСПРЕСС

жидкое беспенное нейтральное средство для экспресс-дезинфекции и обеззараживания кожных покровов

Предназначено для обеззараживания кожных покровов и экспресс-дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей помещений, пищевого технологического, холодильного и торгового оборудования, дефростеров, инвентаря, тары, предметов обстановки, перчаток, надетых на руки персонала, медицинского оборудования, вентиляционных решёток, транспорта в медицинских, санаторно-курортных и детских организациях, на объектах коммунальной и общественно-социальной сферы; автомобильном, железнодорожном транспорте и метрополитене; на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, парфюмерно-косметической, химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности (в помещениях классов чистоты C и D), в быту. Средство эффективно в отношении бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, включая коронавирусы. Готовое для применения средство.

Действующие вещества (ДВ): изопропиловый спирт, пропиловый спирт.

Микробиологическая активность

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных неспорообразующих бактерий, в том числе микобактерий туберкулёза (тестировано на Mycobacterium terrae), бактерий группы кишечных палочек (тестировано на Escherichia Coli), возбудителей стафилококка (тестировано на Staphylococcus aureus); грибов рода Candida и Trichophyton (тестировано на Candida Albicans и Trichophyton Gypseum); вирусов, включая коронавирусы (тестировано на Poliovirus (вакцинный штамм 1-го типа Sabin Lsc-2ab) и Adenovirus человека 5 типа).

Назначение

Обеззараживание кожных покровов и экспресс-дезинфекция небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей помещений, предметов обстановки, медицинских приборов, пищевого технологического (транспортёров, овощечисток, фасовочных аппаратов, хлеборезательных машин и пил, весов и др.), холодильного (льдогенераторов, холодильных камер и проч.) и торгового (весов, прилавков, витрин и др.) оборудования, дефростеров, тары, крупного и мелкого инвентаря (стеллажей, тележек, лотков, подносов, ножей, разделочных досок, слайсеров, подложек для вакуумной упаковки и др.), перчаток, надетых на руки персонала, вентиляционных решёток, транспорта:

- на предприятиях пищевого профиля:
  - ✓ мясной и мясоперерабатывающей промышленности;
  - ✓ по производству и переработке мяса птицы;
  - ✓ по переработке и консервированию рыбы;
  - ✓ по производству молочной продукции, растительных и животных масел и жиров;
  - ✓ по переработке и консервированию фруктов и овощей;
  - ✓ по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов;
  - ✓ хлебопекарной и кондитерской промышленности;
  - ✓ пивоваренной и безалкогольной промышленности;
- на объектах по изготовлению и реализации пищевой продукции, в том числе в отделах кулинарии розничной сети, на заготовочных фабриках, в цехах по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий, комбинатах питания и предприятиях бортового питания;
- в медицинских организациях любого профиля, в санаторно-курортных, детских и образовательных учреждениях;
- на объектах коммунально-бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, массажные и косметические салоны, солярии, прачечные и т.д.);
- в индустрии гостеприимства;
- в организациях культуры, спорта, досуга и развлечений, социального обеспечения, в пенитенциарных учреждениях;
- на предприятиях парфюмерно-косметической, фармацевтической и биотехнологической промышленности, в помещениях классов чистоты C и D.

Особенности

- не требует смывания;

- стабильность микробиологической активности при хранении;
- низкая токсичность.

Ограничения

- не применять для обработки поверхностей из акрилового стекла и других материалов, восприимчивых к спиртам, а также поверхностей, покрытых лаком;
- максимально допустимая площадь обрабатываемой поверхности должна составлять не более 1/10 от площади всего помещения. Например, в помещении общей площадью 10 м² обеззараживаемая поверхность должна составлять не более 1 м².

Состав

Изопропанол 35–36,5 масс. %; н-пропанол 35–36,5 масс. %, вода 15% или более, но менее 30%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом. Показатель pH 6,0–8,0.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы.

Способ применения

Средство используется в виде концентрата. Обработку проводят способами протирания, распыления (орошения).

Способы и режимы применения, меры предосторожности изложены в следующих документах:

- для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, объектов по изготовлению и реализации пищевой продукции – в Инструкции № 5/20 от 07.08.2020 г., утверждённой НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора;
- для медицинских организаций, коммунальных объектов, организаций культуры, спорта, досуга, развлечений и других в сфере обслуживания населения – в Инструкции № 6/20 от 07.08.2020 г., утверждённой НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 4-му классу (вещества малоопасные) при введении в желудок и нанесении на кожу.

Использовать только по назначению. Избегать попадания средства в глаза. Не наносить на раны и слизистые оболочки. При обработке поверхностей рекомендуется использовать влагонепроницаемые перчатки. Работы со средством проводить при включённой вентиляции.

При попадании в глаза промыть их проточной водой, при покраснении глаз закапать 30% раствор сульфацила натрия. При попадании в желудок выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. Затем выпить стакан воды с добавлением 10-15 таблеток измельчённого активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

Не принимать внутрь! Легко воспламеняется! Не допускать контакта с включёнными нагревательными приборами, открытым пламенем.

Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытой таре, в вертикальном положении (крышкой вверх), в сухих крытых вентилируемых и защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от –20 до 30°С вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей, отдельно от лекарств и продуктов питания, в недоступном для детей месте. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 3 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.